



PREVISÃO SUBSAZONAL

ESTADO DE GOIÁS


Data da emissão: 25/06/2026

CARACTERÍSTICAS GERAIS

26 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2026

Entre o final de junho e decorrer de julho, período correspondente ao inverno no Hemisfério Sul, a Região Metropolitana de Goiânia (RMG) deverá apresentar características típicas da estação seca, com predomínio de tempo firme, baixa frequência de precipitações e redução da umidade relativa do ar, especialmente durante as tardes. As temperaturas tendem a apresentar madrugadas e manhãs mais frias, enquanto as tardes permanecem quentes, favorecendo elevada amplitude térmica diária. As projeções climáticas indicam baixa probabilidade de chuva ao longo do mês, com acumulados próximos da média climatológica, que já é naturalmente reduzida para o período. Em relação às temperaturas, há entre 70% e 80% de probabilidade de temperaturas acima da média climatológica em Goiás, embora incursões ocasionais de massas de ar frio possam provocar quedas temporárias de temperatura.

A combinação de tempo firme, ar seco e elevada incidência de radiação solar favorece variações extremas de temperatura dentro de um mesmo período de 24 horas.



Incursões ocasionais de massas de ar frio podem provocar quedas temporárias nas temperaturas mínimas, acentuando ainda mais a amplitude.

Figura 1: Ilustração da previsão para o período de 26 de junho a 23 de julho de 2026.



CEMPA-Cerrado



Portal CEMPA

ANÁLISE DETALHADA

PERÍODO: 26 DE JUNHO A 9 DE JULHO (14 DIAS)

Historicamente, o final de junho e o início de julho correspondem a um dos períodos mais secos do ano na RMG. Entre os dias 26 de junho e 09 de julho de 2026, a previsão será de predomínio de condições atmosféricas estáveis, com baixa probabilidade de chuva e ocorrência de longos períodos de sol, características típicas da estação seca no Centro-Oeste brasileiro. A umidade relativa do ar também deverá apresentar redução significativa nos horários de maior aquecimento, podendo atingir valores inferiores a 25%.

DESTAQUES

- Tempo estável;
- Baixa probabilidade de ocorrência de chuvas ou tempestades;
- Alta probabilidade de dias consecutivos sem chuva e baixa umidade do ar.

GOIÂNIA

Em Goiânia e grande parte da RMG, o tempo seguirá estável, com temperaturas máximas oscilando entre de 29°C - 31°C e mínimas de 8°C - 12°C.

Média climatológica da precipitação para o período (26 de junho a 09 de julho): aproximadamente 0,8 mm - Goiânia

Panorama Subsazonal: Predomínio de Estabilidade (26 Jun a 23 Jul)

A transição entre o final de junho e julho será marcada por condições típicas e consolidadas da estação seca na Região Metropolitana de Goiânia (RMG).



Figura 2: Ilustração da previsão para o período de 26 de junho a 09 de julho de 2026.



CEMPA-Cerrado



Portal CEMPA

PERÍODO: 10 A 23 DE JULHO (14 DIAS)

No segundo decêndio de julho, a RMG deverá manter características típicas da estação seca, com predomínio de tempo firme, baixa nebulosidade e reduzida ocorrência de precipitação. As temperaturas mínimas tendem a variar entre 7°C e 12°C durante as madrugadas e primeiras horas da manhã, enquanto as máximas podem atingir valores entre 28°C e 31°C durante a tarde. A combinação entre céu aberto, ar seco e elevada incidência de radiação solar favorece grande amplitude térmica diária, característica marcante do inverno no território goiano.

DESTAQUES

- Predomínio de tempo estável;
- Baixa probabilidade de ocorrência de chuvas ou tempestades;
- Forte amplitude térmica diária e baixa umidade relativa do ar.

GOIÂNIA

Média climatológica da precipitação para o período (10 a 23 de julho):

aproximadamente 0,5 mm - Goiânia

Previsão para os municípios: tempo firme com baixa probabilidade para ocorrência de chuva.

Consolidação do padrão de inverno do Brasil Central, com forte sinal de anomalia térmica positiva.


Análise de Julho:

Anomalia Térmica: Modelos indicam probabilidade superior a 80% de temperaturas acima da média climatológica em praticamente todo o território goiano.


Pluviometria: Acumulados acompanham o padrão naturalmente reduzido da estação seca.

Umidade: Períodos consecutivos sem chuva intensificam a queda da umidade relativa.

Previsão Probabilística de Conjunto Multi-modelo
CMCC, CPTEC, ECMWF, Exeter, Melbourne, Montreal, Moscow, Offenbach, Toulouse, Washington
Precipitação: JULHO 2026 (emitido em Junho de 2026)



Previsão Probabilística de Conjunto Multi-modelo
CMCC, CPTEC, ECMWF, Exeter, Melbourne, Montreal, Moscow, Offenbach, Toulouse, Washington
Temperatura 2m: JULHO 2026 (emitido em Junho de 2026)



>80% Probabilidade
Área de
Temperatura
Acima da Média

Figura 3: Ilustração da previsão para o período de julho de 2026.



CEMPA-Cerrado



Portal CEMPA

PREVISÃO SAZONAL

JULHO-AGOSTO-SETEMBRO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PERÍODO

O monitoramento do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) é realizado por meio da análise das anomalias da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial, especialmente na região Niño 3.4. As projeções mais recentes indicam uma rápida evolução das condições oceânicas e atmosféricas para um episódio de El Niño durante o segundo semestre de 2026. As previsões probabilísticas estacam para uma probabilidade próxima de 98% a 99% de ocorrência de El Niño entre o inverno e a primavera do Hemisfério Sul, com predominância das categorias moderada e forte nos trimestres Julho-Agosto-Setembro (JAS) e Agosto-Setembro-Outubro (ASO). Ademais, nota-se um aumento expressivo da probabilidade de um evento de El Niño muito forte a partir da primavera, especialmente entre os trimestres Setembro-Outubro-Novembro (SON) e Novembro-Dezembro-Janheiro (NDJ), quando essa categoria passa a representar a maior parcela das projeções.

**Previsão probabilística do El Niño - Oscilação Sul (Emitido em Junho de 2026)
baseado nos limiares dos índices Niño 3.4 e RONI**




Figura 4: Projeção do evento climático El Niño.



CEMPA-Cerrado



Portal CEMPA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DE JULHO DE 2026

Em Goiás, durante o inverno, tornam-se mais frequentes os períodos consecutivos sem chuva, acompanhados por baixos valores de umidade relativa do ar, especialmente durante as tardes. De acordo com dados climatológicos do INMET, a média histórica de precipitação para o mês de julho em Goiânia é de aproximadamente 1,6 mm, refletindo o início da estação seca na RMG. Os acumulados de chuva tornam-se ainda menores, consolidando o padrão típico do inverno no Brasil Central. A temperatura média compensada para esse período varia, em média, entre 20°C e 22°C. Além disso, os modelos probabilísticos de previsão climática indicam elevada probabilidade, em alguns setores superior a 80%, de ocorrência de temperaturas acima da média climatológica em praticamente todo o estado de Goiás.





Figura 5: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para julho de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: <https://wmolc.org/home>



CEMPA-Cerrado



Portal CEMPA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DE AGOSTO DE 2026

Para o estado de Goiás, especialmente na faixa sul do território, as previsões probabilísticas para agosto de 2026 indicam maior probabilidade de ocorrência de precipitação acima da média climatológica, com valores próximos de 60% em parte da região. Embora agosto corresponda ao auge da estação seca no Brasil Central, a probabilidade é de condições relativamente mais úmidas do que o padrão normalmente observado para o período. No que se refere à temperatura, as projeções mostram valores acima da média climatológica, com aproximadamente 80% de chance de ocorrência de anomalias positivas em grande parte do estado de Goiás. Esse comportamento é compatível com um cenário de aquecimento mais persistente durante o mês e pode estar associado, entre outros fatores, à evolução de um episódio de El Niño.





Figura 6: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para agosto de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima.
Fonte: <https://wmolc.org/home>



CEMPA-Cerrado



Portal CEMPA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SETEMBRO DE 2026

Para o mês de setembro de 2026, as previsões probabilísticas indicam que os acumulados de precipitação sobre o território goiano deverão permanecer, em sua maior parte, um pouco acima da média climatológica, com uma leve tendência de ocorrência de chuvas acima do padrão esperado para o período. Apesar de setembro ainda integrar a estação seca no Brasil Central, esse cenário pode favorecer episódios isolados de precipitação associados ao processo gradual de transição para a estação chuvosa. Em relação à temperatura, a previsão probabilística mostra valores acima da média climatológica sobre a RMG e grande parte do Centro-Oeste, com probabilidades variando entre aproximadamente 70% e 80%.





Figura 7: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para setembro de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: <https://wmolc.org/home>

TENDÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA PARA O TRIMESTRE JAS/2026

A análise das previsões probabilísticas para o trimestre julho-agosto-setembro de 2026 (JAS) indica que o estado de Goiás, incluindo a RMG, deverá apresentar precipitação um pouco acima da média climatológica, com possibilidade de anomalias positivas pontuais em parte do Brasil Central. Embora o período corresponda à estação seca, não se descarta a ocorrência de episódios isolados de chuva. Em relação à temperatura, as projeções apontam elevada probabilidade de valores acima da média climatológica, favorecendo tardes mais quentes e maior amplitude térmica diária. Esse comportamento pode estar associado ao episódio de El Niño durante o trimestre, capaz de modificar os padrões de circulação atmosférica e influenciar as condições de temperatura e precipitação sobre o Brasil Central.




Figura 8: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para o trimestre julho-agosto-setembro de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: <https://wmo.org/home>