# PREVISÃO SUBSAZONAL

## ESTADO DE GOIÁS

**Data da emissão: 30/10/2026**




## CARACTERÍSTICAS GERAIS

### NOVEMBRO DE 2026

Durante o mês de novembro de 2026, as projeções climáticas ainda apresentam incertezas quanto à distribuição espaço-temporal das chuvas em Goiás, sem a definição de um padrão predominante em grande parte do estado. Embora novembro represente um período de consolidação do início da estação chuvosa na região Centro-Oeste, as precipitações poderão ocorrer de maneira irregular, com alternância entre episódios de picos de volumes de chuva e intervalos de dias consecutivos de estiagem. Quanto a Oscilação Madden-Julian (OMJ), atualmente na fase 2, poderá exercer influência sobre a circulação atmosférica na América do Sul, modulando a atividade convectiva e a atuação de sistemas meteorológicos. Entretanto, seus efeitos sobre Goiás dependerão da intensidade e da propagação da oscilação, bem como de sua interação com o transporte de umidade proveniente da Amazônia, dos sistemas frontais e da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).





Figura 1: Ilustração da previsão para o mês de novembro de 2026.

# ANÁLISE DETALHADA

## PERÍODO: 01 A 15 DE NOVEMBRO (15 DIAS)

Para a primeira quinzena de novembro, devido a passagem de frentes frias e pela intensificação do transporte de umidade proveniente da Amazônia, os modelos de previsão indicam aumento da instabilidade atmosférica nas regiões sudoeste e sul de Goiás, bem como na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Essa configuração atmosférica deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva, com distribuição espacial irregular e possibilidade de acumulados acima da média climatológica. Apesar da maior frequência das precipitações, as temperaturas deverão permanecer acima dos padrões climatológicos, com anomalias positivas da ordem de +2°C, indicando a persistência de condições mais quentes que o habitual para o período.

### DESTAQUES

- **Média probabilidade de ocorrência de chuvas ou tempestades para a primeira quinzena de novembro;**
- **Temperatura do ar acima da média.**

### GOIÂNIA

**Em Goiânia e grande parte da RMG, o tempo seguirá instável nos primeiros dias de novembro, com temperaturas máximas oscilando entre de 39°C - 42°C e mínimas de 19°C - 21°C.**

Média climatológica da precipitação para o período (01 a 15 de novembro): aproximadamente 96,45 mm - Goiânia





Figura 2: Ilustração da previsão para o período de 01 a 15 de novembro de 2026.

## PERÍODO: 16 A 30 DE NOVEMBRO (15 DIAS)

Durante a segunda quinzena de novembro, a RMG deverá permanecer sob influência de um padrão atmosférico mais favorável à ocorrência de estabilidade, associado à presença de um centro de alta pressão. Esse cenário tende a favorecer a inibição de nebulosidade, precipitação intermitente e dias consecutivos sem chuva. Em relação às temperaturas, a tendência permanece de valores elevados, com máximas frequentemente superiores a 39°C durante o período da tarde.

### DESTAQUES

- **OMJ atuando na fase 2;**
- **Média probabilidade de ocorrência de chuvas ou tempestades;**
- **Temperaturas acima da média.**

### GOIÂNIA

Média climatológica da precipitação para o período (16 a 30 de novembro): aproximadamente 123,15 mm - Goiânia
Previsão para os municípios da RMG: condições de tempo estável / instável com média probabilidade para ocorrência de chuva.





Figura 3: Ilustração da previsão para o período de 16 a 30 de novembro de 2026.

# PREVISÃO SAZONAL

## NOVEMBRO-DEZEMBRO-JANEIRO

### CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PERÍODO

O evento El Niño de 2026 continua a se intensificar em toda a Bacia Oceânica do Pacífico equatorial central e oriental / leste. O índice Niño 3.4 apresenta uma elevação acentuada e sustentada, com a média sazonal atingindo +2,46°C no período de julho a setembro de 2026, e o valor mensal de setembro subindo ainda mais, para +2,84°C. O índice semanal mais recente do Niño 3.4, referente à semana centrada em 14 de outubro de 2026, alcançou +3,3°C, fornecendo mais evidências de que o El Niño já está muito forte e continua a se intensificar. As anomalias semanais da temperatura da superfície do mar no Pacífico equatorial centro-oriental permaneceram acima de +3,0°C pela quinta semana consecutiva, o que ressalta a intensidade e a persistência excepcionais deste evento. Para o estado de Goiás, as projeções climáticas para o trimestre de outubro a dezembro de 2026 indicam predomínio de temperaturas acima da média climatológica, com ocorrência de chuvas irregulares e volumes de precipitação abaixo do esperado em parte do território goiano.





Figura 4: Ilustração da previsão para o trimestre NDJ.







Figura 5: Ilustração da previsão para o trimestre NDJ.

## CARACTERÍSTICAS GERAIS DE DEZEMBRO DE 2026

Para dezembro de 2026, a previsão probabilística indica redução da precipitação em grande parte do território goiano. Mesmo com o início da a estação chuvosa, a distribuição das precipitações permanecerá irregular, com alternância entre períodos de menor ocorrência de chuva e episódios de maior instabilidade atmosférica. Em relação à temperatura do ar, o sinal é mais predominante, com alta probabilidade de temperaturas acima da média climatológica em praticamente todo o estado de Goiás, alcançando percentuais acima de 90% em toda a região Centro-Oeste do Brasil. Esse cenário ocorre devido ao fortalecimento do El Niño, condição que poderá contribuir para a manutenção de temperaturas elevadas durante o final da primavera e início do verão austral.





Figura 6: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para dezembro de 2026 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: https://wmolc.org/home

## CARACTERÍSTICAS GERAIS DE JANEIRO DE 2027

Para janeiro de 2027, período em que a estação chuvosa já se encontra climatologicamente estabelecida na Região Centro-Oeste, a previsão indica média probabilidade de precipitação abaixo da média climatológica em grande parte do estado de Goiás. Dessa forma, apesar de janeiro estar entre os meses climatologicamente mais chuvosos do ano, a distribuição das precipitações poderá apresentar irregularidades, caracterizadas pela alternância entre intervalos de menor atividade pluviométrica e episódios de maior instabilidade atmosférica. Em relação às temperaturas, o sinal permanece bastante consistente, com elevada probabilidade de valores acima da média climatológica em praticamente todo o território goiano, ultrapassando percentuais entre 90% e 95% em várias áreas.





Figura 7: Previsão probabilística das anomalias de precipitação e temperatura para janeiro de 2027 na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: https://wmolc.org/home

## TENDÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA PARA O TRIMESTRE OD/2026-J2027

Para o trimestre de novembro de 2026 a janeiro de 2027 (NDJ), as previsões exibem maior tendência de precipitação abaixo da média climatológica no estado de Goiás, embora persistam diferenças espaciais na intensidade e na confiabilidade desse sinal. Esse cenário favorecerá a distribuição irregular das chuvas, com alternância entre episódios de variabilidade volumétrica da precipitação, mesmo durante a estação chuvosa. A previsão ocorre em um contexto de aquecimento anômalo das águas superficiais do Pacífico Equatorial, associado ao desenvolvimento do fenômeno El Niño, cuja influência sobre a circulação atmosférica pode modificar os padrões de convecção e transporte de umidade na América do Sul. Entretanto, a intensidade do El Niño não determina, isoladamente, o comportamento das chuvas em Goiás, uma vez que a resposta regional depende da interação com outros mecanismos atmosféricos, incluindo a ZCAS, a OMJ e a atuação de sistemas frontais. Em relação à temperatura do ar, as projeções apresentam sinal mais consistente, com elevada probabilidade de temperaturas acima da média climatológica em praticamente todo o território goiano, favorecendo a persistência de condições mais quentes que o habitual ao longo do trimestre.





Figura 8: Previsão probabilística das anomalias de precipitação para o trimestre novembro de 2026 a janeiro de 2027 (NDJ), na América do Sul. Resultados obtidos a partir de saídas de modelos globais de previsão numérica do tempo e do clima. Fonte: https://crc-osa.ciifen.org/en/