ao fato de um operador linear ser diagonalizável ou não, o conjunto dos escalares no qual trabalhamos desempenha um papel importante.

Ainda assim, mesmo permitindo valores complexos, nem todo operador linear é diagonalizável. Por exemplo, seja $T: V \rightarrow V$, onde V é um espaço vetorial complexo de dimensão 4 e

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

onde α é uma base de V . Então, o polinômio característico de T é $p(\lambda) = (\lambda - i)(\lambda + i)(\lambda - 1)^2$, e portanto seus autovalores são $\lambda_1 = i$, $\lambda_2 = -i$, $\lambda_3 = 1$ (com multiplicidade 2). Não é possível, entretanto, encontrar dois autovalores LI (tente!) para $\lambda_3 = 1$, e assim T não é diagonalizável.

Porém, quando $T: V \rightarrow V$ for um operador linear não diagonalizável e V um espaço vetorial *complexo*, poderemos achar sempre uma base β de V , tal que $[T]_{\beta}^{\beta}$ assumirá uma forma especial, chamada *forma de Jordan*. Esta forma é obtida por blocos do tipo

$$\begin{bmatrix} \lambda_i & & & 0 \\ 1 & \lambda_i & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & & \lambda_i \\ 0 & & & 1 & \lambda_i \end{bmatrix}$$

ou $[\lambda_i]$ colocados na diagonal.

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

A demonstração deste fato é um tópico especial que deve fazer parte de um estudo mais avançado de Álgebra Linear³.

7.5 EXERCÍCIOS

- Entre os operadores dos exercícios 2 a 8 da seção 6.3 verifique quais são diagonalizáveis.
- Dizemos que uma matriz $A_n \times n$ é *diagonalizável* se seu operador associado $T_A: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ for diagonalizável, ou seja, A é diagonalizável se, e somente se A admitir n autovetores LI. Baseado nisso, verifique quais das matrizes dos Exercícios 9 a 18 da seção 6.3 são diagonalizáveis.

- Dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- A é diagonalizável (use a definição do exercício anterior).
 - Encontre seu polinômio minimal.
- Seja A uma matriz 3×3 triangular superior, com todos os seus elementos acima da diagonal distintos e não nulos.

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$$

- Quais são os autovetores e autovetores de A ?
 - Qual é o polinômio minimal de A ?
- Para quais valores de a as matrizes abaixo são diagonalizáveis?

$$a) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix} \qquad b) \quad B = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

³Para detalhes consulte Lipschitz, S. *Álgebra Linear*. Mc Graw-Hill do Brasil Ltda., Rio de Janeiro, 1971; ou Hoffman, K. e Kunze, R. *Álgebra Linear*, Editora Polígono, São Paulo, 1971; ou Gelfond, I. M. *Lectures in Linear Algebra*; Interscience Publishers, New York, 1961.

6. Sejam $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ linear, $\alpha = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, a base canônica de $\mathbb{R}^3$, $\beta = \{(0, 1, 1), (0, -1, 1), (1, 0, 1)\}$ e

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

- a) Encontre o polinômio característico de T , os autovalores de T e os autovetores correspondentes.
 b) Ache $[T]_{\beta}^{\beta}$ e o polinômio característico. Que observação você faz a este respeito?
 c) Encontre uma base γ de $\mathbb{R}^3$, se for possível, tal que $[T]_{\gamma}^{\gamma}$ seja diagonal.

7. a) Sejam $T: V \rightarrow V$ um operador linear (V de dimensão finita) e α e β bases distintas de T . Mostre que

$$\det [T]_{\alpha}^{\alpha} = \det [T]_{\beta}^{\beta}$$

(Sugestão: veja a relação entre $[T]_{\alpha}^{\alpha}$ e $[T]_{\beta}^{\beta}$ no Capítulo 6).

- b) Se $A_{n \times m}$ é diagonalizável, mostre que o determinante de A é o produto de seus autovalores.

(Sugestão: considere $T_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, observando que a matriz de T_A na base canônica é exatamente A . Use então o resultado do item (a) considerando como α a base canônica e β a base de autovetores.

8. Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ é semelhante à matriz $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

9. a) Mostre que um operador linear T (num espaço de dimensão finita) que comuta com qualquer operador linear diagonalizável é diagonalizável.

- b) Nas condições do item (a) mostre que na verdade T é um múltiplo escalar do operador identidade, isto é, existe um número r tal que $T = r \cdot I$.

10. Diz-se que um operador linear $T: V \rightarrow V$ é *nilpotente* se existir um número inteiro positivo n , tal que $T^n = 0$ (isto é, $T \circ T \circ T \circ \dots \circ T(v) = 0$) para todo $v \in V$).

- a) Seja T nilpotente. Encontre seus autovalores.
 b) Encontre uma matriz $A_{2 \times 2} \neq 0$ tal que $T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ seja nilpotente.
 c) Mostre que um operador linear nilpotente, não nulo, não é diagonalizável.

11. Diz-se que um operador linear $T: V \rightarrow V$ é *idempotente* se $T^2 = T$ (isto é, se $T \circ T(v) = T(v)$) para todo $v \in V$).

- a) Seja T idempotente. Ache seus autovalores.
 b) Encontre uma matriz $A_{2 \times 2} \neq 0$ tal que $T_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ seja idempotente.
 c) Mostre que um operador linear idempotente é diagonalizável.

- *12. Mostre que $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ não é diagonalizável. No entanto, se A representar, numa certa base, um operador linear $T: V \rightarrow V$, onde V é um espaço vetorial complexo, então T é diagonalizável. Verifique este fato ou, equivalentemente, que existe uma matriz com elementos complexos $P_{3 \times 3}$, inversível, tal que

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix}$$

- *13. Problema-pesquisa:

Seja

$$A = \begin{bmatrix} M & a & a & \dots & a & a \\ a & M & a & \dots & a & a \\ a & a & M & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & M & a \\ a & a & a & \dots & a & M \end{bmatrix}_{n \times n}$$

onde M e $a \neq 0$ são números reais. Mostre que

- a) Os autovalores de A são

$$\lambda = M - a \text{ com multiplicidade } n - 1$$

$$\text{e } \mu = M + (n - 1)a$$

- b) $\det A = (M - a)^{n-1} \cdot [M + (n - 1)a]$

(Este é um caso particular da situação estudada no artigo "sobre uma classe de matrizes cujo problema de autovalores é facilmente solucionável" de Odejar Leite Linhares, publicado na revista Ciência e Cultura (SBPC) volume 29, número 8, de agosto de 1.977.)

14. Utilize a forma diagonal para encontrar A^n nos seguintes casos (n natural):

$$a) A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$b) A = \begin{bmatrix} 0 & 7 & -6 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Você pode generalizar o seu procedimento para o caso de uma matriz quadrada qualquer? Quais são as condições?

*15. Considere o sistema mecânico mostrado na figura abaixo

Utilizando os procedimentos da seção 7.1.5 estude a vibração do sistema quando ele é tirado da posição de equilíbrio. Resolva completamente descrevendo o comportamento do sistema no caso em que $m_1 = 0,5 \text{ kg}$, $m_2 = 0,5 \text{ kg}$, $k_1 = 1,2 \frac{N}{m}$, $k_2 = 1,8 \frac{N}{m}$. Os deslocamentos iniciais dos corpos 1 e 2 são, respectivamente, $0,1 \text{ m}$ para cima e $0,2 \text{ m}$ para baixo.

7.5.1 Respostas

- 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4 e 6.3.8 são diagonalizáveis.
- 6.3.9; 6.3.10; 6.3.13; 6.3.14; 6.3.16 e 6.3.17 são diagonalizáveis.
- a) Não
b) $p(x) = (2 - x)^2 (3 - x)$
- a) $a \neq 1$
b) $a = 0$
- a) $p(\lambda) = (2 - \lambda)(3 + \lambda)^2$; $\lambda_1 = 2$, $v_1 = (x, 0, 0)$; $\lambda_2 = -3$, $v_2 = (0, y, 0)$

b)

$$[T]_{\beta}^{\beta} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -\frac{5}{2} \\ -1 & -4 & -\frac{7}{2} \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, p(\lambda) = (2 - \lambda)(3 + \lambda)^2$$

O polinômio característico é independente da base.

c) Não existe.

8. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

10. a) $\lambda = 0$

b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) Se T fosse diagonalizável, existiria uma base β tal que os autovalores estivessem na diagonal de $[T]_{\beta}^{\beta}$, uma matriz diagonal. Mas os únicos autovalores de T são 0 (veja a), e logo, $[T]_{\beta}^{\beta} = 0$. É dizer, T seria nulo, o que não está de acordo com a hipótese.

11. a) $\lambda = 0$ ou 1

b) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

c) Como $T^2 v = T v$, $(T^2 - T)v = 0$, ou seja, $T^2 - T = 0$

Seja $p(x) = x^2 - x = x(x - 1)$. Então $p(T) = 0$
Como os autovalores de T são 0 e 1, o polinômio característico de T é da forma $p(\lambda) = (-\lambda)^n (1 - \lambda)^n$. Então $p(x)$ é o polinômio minimal de T e como os fatores lineares são distintos, T é diagonalizável.

14. a) Note que se temos uma matriz diagonal então $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}^n =$

$= \begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{bmatrix}$. Diagonalize, então, a matriz A calculando os autovalores e autovetores respectivos (é possível fazer isto), bem como a matriz de mudança de base. Utilizando 5.4.10 pode-se escrever

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

Portanto

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}^n \cdot \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 + 2^{n+2} & 4 - 2^{n+2} \\ -1 + 2^n & 4 - 2^n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

b) É similar ao anterior.