V Workshop de Álgebra UFG-CAC

Só Funções

Francismar Ferreira Lima

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

09 de novembro de 2016

Planejamento da Apresentação

- 1 Produto Cartesiano
- 2 Relação Binária
- 3 Funções
- 4 Gráfico de uma Função
- 5 Função Composta
- 6 Injeção, Sobrejeção e Bijeção
- 7 Função Inversa

Produto Cartesiano

Definição

O **produto cartesiano** entre dois conjuntos A e B não-vazios é o conjunto

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

O elemento $(a, b) \in A \times B$ é chamado **par ordenado**. Dizemos que $(a, b), (c, d) \in A \times B$ são iguais, i.e.,

$$(a, b) = (c, d) \text{ se, e somente se, } a = c \text{ e } b = d.$$

Caso $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, então definimos $A \times B := \emptyset$.

Observação

Veja que $A \times B \neq B \times A!$

Produto Cartesiano

Definição

O **produto cartesiano** entre dois conjuntos A e B não-vazios é o conjunto

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

O elemento $(a, b) \in A \times B$ é chamado **par ordenado**. Dizemos que $(a, b), (c, d) \in A \times B$ são iguais, i.e.,

$$(a, b) = (c, d) \text{ se, e somente se, } a = c \text{ e } b = d.$$

Caso $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, então definimos $A \times B := \emptyset$.

Observação

Veja que $A \times B \neq B \times A$!

Produto Cartesiano

Exemplo

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 5\}$. Então,

$$A \times B = \{(1, -1), (1, 5), (2, -1), (2, 5), (3, -1), (3, 5)\}.$$

e

$$B \times A = \{(-1, 1), (-1, 2), (-1, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}.$$

Exemplo

Sejam $A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ e $B = \{*, \diamond\}$. Então,

$$A \times B = \left\{ \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, * \right), \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \diamond \right), \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, * \right), \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \diamond \right) \right\}.$$

Produto Cartesiano

Exemplo

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 5\}$. Então,

$$A \times B = \{(1, -1), (1, 5), (2, -1), (2, 5), (3, -1), (3, 5)\}.$$

e

$$B \times A = \{(-1, 1), (-1, 2), (-1, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}.$$

Exemplo

Sejam $A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ e $B = \{\star, \diamond\}$. Então,

$$A \times B = \left\{ \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \star \right), \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \diamond \right), \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \star \right), \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \diamond \right) \right\}.$$

Relação Binária

Definição

Dados dois conjuntos A e B , uma **relação binária r de A em B** é formada por três partes:

- pelo conjunto A ;
- pelo conjunto B ;
- por um subconjunto R qualquer de $A \times B$, i.e., $R \subseteq A \times B$.

Definição

Dados os conjuntos A e B e uma relação binária r de A em B . O **domínio** de r é o conjunto $D(r) = \{x \in A : (x, y) \in R\}$, o **contra-domínio** de r é o conjunto $Cd(r) = B$ e a **imagem** de r é o conjunto $Im(r) = \{y \in B : (x, y) \in R\}$.

Observação

Por vezes, quando já conhecidos o domínio e o contra-domínio de uma relação binária r , denominamos R também de relação binária!

Relação Binária

Definição

Dados dois conjuntos A e B , uma **relação binária** r de A em B é formada por três partes:

- pelo conjunto A ;
- pelo conjunto B ;
- por um subconjunto R qualquer de $A \times B$, i.e., $R \subseteq A \times B$.

Definição

Dados os conjuntos A e B e uma relação binária r de A em B . O **domínio** de r é o conjunto $D(r) = \{x \in A : (x, y) \in R\}$, o **contra-domínio** de r é o conjunto $Cd(r) = B$ e a **imagem** de r é o conjunto $Im(r) = \{y \in B : (x, y) \in R\}$.

Observação

Por vezes, quando já conhecidos o domínio e o contra-domínio de uma relação binária r , denominamos R também de relação binária!

Relação Binária

Exemplo

$$A = \{-1, 2, 3, 4\}, B = \{1, 2\} \text{ e } R = \{(x, y) \in A \times B : x < y\}$$

$$A \times B = \{(-1, 1), (-1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$$

Exemplo

$$A = \{-1, 0, 1\} \text{ e } R = \{(x, y) \in A \times A : x^2 \leq y^2\}$$

$$A \times A = \{(-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1)\}$$

Relação Binária

Exemplo

$$A = \{-1, 2, 3, 4\}, B = \{1, 2\} \text{ e } R = \{(x, y) \in A \times B : x < y\}$$

$$A \times B = \{(-1, 1), (-1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$$

Exemplo

$$A = \{-1, 0, 1\} \text{ e } R = \{(x, y) \in A \times A : x^2 \leq y^2\}$$

$$A \times A = \{(-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1)\}$$

Relação Binária

Exemplo

$$A = \left\{ \{1\}, \{\star, \circ\}, \mathbb{N} \right\}, B = \{1, 2\} \text{ e } R = \{(x, y) \in A \times B : \#x = y\}$$

$$A \times B = \left\{ (\{1\}, 1), (\{1\}, 2), (\{\star, \circ\}, 1), (\{\star, \circ\}, 2), (\mathbb{N}, 1), (\mathbb{N}, 2) \right\}$$

Exemplo

$$A = M_2(\mathbb{R}), B = \mathbb{R} \text{ e } R = \{(x, y) \in A \times B : \det(x) = y\}$$

Relação Binária

Exemplo

$$A = \left\{ \{1\}, \{\star, \circ\}, \mathbb{N} \right\}, B = \{1, 2\} \text{ e } R = \{(x, y) \in A \times B : \#x = y\}$$

$$A \times B = \left\{ (\{1\}, 1), (\{1\}, 2), (\{\star, \circ\}, 1), (\{\star, \circ\}, 2), (\mathbb{N}, 1), (\mathbb{N}, 2) \right\}$$

Exemplo

$$A = \mathbb{M}_2(\mathbb{R}), B = \mathbb{R} \text{ e } R = \{(x, y) \in A \times B : \det(x) = y\}$$

Funções

Definição

Dados dois conjuntos A e B , uma **função** f de A em B é uma relação binária f de A em B (i.e., é formada pelo conjunto A , pelo conjunto B e por um subconjunto F de $A \times B$) tal que

para todo $x \in A$, **existe um único** $y \in B$ tal que $(x, y) \in F$.

Definição

Sejam A e B conjuntos e f uma **função** de A em B . Dado $(x, y) \in F$, denominamos y de **função de** x e o denotamos por $y = f(x)$. Denominamos ainda a equação " $y = f(x)$ " de **lei de associação** de f .

Notação

Denotamos uma função f de A em B por

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Funções

Definição

Dados dois conjuntos A e B , uma **função** f de A em B é uma relação binária f de A em B (i.e., é formada pelo conjunto A , pelo conjunto B e por um subconjunto F de $A \times B$) tal que

para todo $x \in A$, **existe um único** $y \in B$ tal que $(x, y) \in F$.

Definição

Sejam A e B conjuntos e f uma **função** de A em B . Dado $(x, y) \in F$, denominamos y de **função de** x e o denotamos por $y = f(x)$. Denominamos ainda a equação " $y = f(x)$ " de **lei de associação** de f .

Notação

Denotamos uma função f de A em B por

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Funções

Definição

Dados dois conjuntos A e B , uma **função** f de A em B é uma relação binária f de A em B (i.e., é formada pelo conjunto A , pelo conjunto B e por um subconjunto F de $A \times B$) tal que

para todo $x \in A$, **existe um único** $y \in B$ tal que $(x, y) \in F$.

Definição

Sejam A e B conjuntos e f uma **função** de A em B . Dado $(x, y) \in F$, denominamos y de **função de** x e o denotamos por $y = f(x)$. Denominamos ainda a equação " $y = f(x)$ " de **lei de associação** de f .

Notação

Denotamos uma função f de A em B por

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Funções

Exemplo

Seja $T = \{x : x \text{ é um triângulo no plano}\}$. Definamos f como sendo a relação binária de T em $\mathbb{R}$, onde

$$F = \{(x, y) \in T \times \mathbb{R} : y \text{ é igual à área de } x\}.$$

Pela definição de função, temos que f é uma função.

Exemplo

Seja $T = \{y : y \text{ é um triângulo no plano}\}$. Definamos f como sendo a relação binária de $\mathbb{R}$ em T , onde

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times T : y \text{ é igual ao triângulo com área } x\}.$$

Pela definição de função, temos que f NÃO é uma função.

Funções

Exemplo

Seja $T = \{x : x \text{ é um triângulo no plano}\}$. Definamos f como sendo a relação binária de T em $\mathbb{R}$, onde

$$F = \{(x, y) \in T \times \mathbb{R} : y \text{ é igual à área de } x\}.$$

Pela definição de função, temos que f é uma função.

Exemplo

Seja $T = \{y : y \text{ é um triângulo no plano}\}$. Definamos f como sendo a relação binária de $\mathbb{R}$ em T , onde

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times T : y \text{ é igual ao triângulo com área } x\}.$$

Pela definição de função, temos que f NÃO é uma função.

Funções

Definição

Sejam A, B, C e D conjuntos e $f : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow D$ funções. Então,

$$f = g \Leftrightarrow A = C, B = D \text{ e } \forall x \in A = C, f(x) = g(x).$$

Assim, duas funções são iguais se, e somente se, possuírem:

- o mesmo domínio;
- o mesmo contra-domínio;
- a mesma lei de associação!

Observação

Observe que os conceitos de **Domínio**, **Contra-domínio** e **Imagem** de uma função são os mesmos já definidos anteriormente, pois funções são relações! Além disso, sendo $f : A \rightarrow B$ uma função, podemos denotar sua imagem por

$$Im(f) \text{ ou } f(A).$$

Veja que $Im(f) = \{y \in B : y = f(x), \text{ para algum } x \in A\} = \{f(x) \in B : x \in A\}$.

Funções

Definição

Sejam A, B, C e D conjuntos e $f : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow D$ funções. Então,

$$f = g \Leftrightarrow A = C, B = D \text{ e } \forall x \in A = C, f(x) = g(x).$$

Assim, duas funções são iguais se, e somente se, possuírem:

- o mesmo domínio;
- o mesmo contra-domínio;
- a mesma lei de associação!

Observação

Observe que os conceitos de **Domínio**, **Contra-domínio** e **Imagem** de uma função são os mesmos já definidos anteriormente, pois funções são relações! Além disso, sendo $f : A \rightarrow B$ uma função, podemos denotar sua imagem por

$$Im(f) \text{ ou } f(A).$$

Veja que $Im(f) = \{y \in B : y = f(x), \text{ para algum } x \in A\} = \{f(x) \in B : x \in A\}$.

Gráfico de uma Função

Definição

Seja A e B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função. Definimos o **gráfico** de f como sendo o conjunto F , i.e., como sendo

$$\text{Graf}(f) = F = \{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}.$$

Observação

Pela igualdade de funções vista no último *slide* segue que duas funções f e g são iguais se, e somente se, possuírem mesmos domínios, contra-domínios e gráficos!

Gráfico de uma Função

Definição

Seja A e B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função. Definimos o **gráfico** de f como sendo o conjunto F , i.e., como sendo

$$\text{Graf}(f) = F = \{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}.$$

Observação

Pela igualdade de funções vista no último *slide* segue que duas funções f e g são iguais se, e somente se, possuírem mesmos domínios, contra-domínios e gráficos!

Exemplos de Gráficos de Funções

Exemplos de Gráficos de Funções

Exemplos de Gráficos de Funções

Exemplos de Gráficos de Funções

Exemplos de Gráficos de Funções

Exemplos de Gráficos de Funções

$$f(x,y) = \frac{\text{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

Função Composta

Definição

Sejam $f : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow D$ funções tais que $f(A) \subseteq C$.

A **função composta de g e f** é a função

$$h : A \rightarrow D \text{ dada por } h(x) = g(f(x)).$$

h é denotada por $g \circ f$ (lê-se "g bola f").

Observação

A composição de funções é associativa, mas não é comutativa!

Função Composta

Exemplo

Sejam $A = \{-1, 0, 1, 3, 4\}$, $B = \{0, 1, 3, 9, 16\}$, $C = \{0, 1\}$ e $D = \{-1, 0, 1, 3, 5, 7, 11\}$, $f : A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x^2$ e $g : C \rightarrow D$ dada por $g(x) = 2x + 1$.

Não podemos definir $g \circ f$, pois $f(A) \not\subseteq C$. Mas, podemos definir $f \circ g$, pois $G(C) \subseteq A$.

Veja que $f \circ g(x) = f(g(x)) = 4x^2 + 4x + 1$.

Exemplo (associatividade e não-comutatividade da função composta)

Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x + 1$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x^2$ e $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $h(x) = |x|$.

Veja que $f \circ h \neq h \circ f$, pois $f \circ h(x) = f(|x|) = |x| + 1$ e $h \circ f(x) = h(x + 1) = |x + 1|$, que são diferentes!

Por outro lado, veja que $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

Função Composta

Exemplo

Sejam $A = \{-1, 0, 1, 3, 4\}$, $B = \{0, 1, 3, 9, 16\}$, $C = \{0, 1\}$ e $D = \{-1, 0, 1, 3, 5, 7, 11\}$, $f : A \rightarrow B$ dada por $f(x) = x^2$ e $g : C \rightarrow D$ dada por $g(x) = 2x + 1$.

Não podemos definir $g \circ f$, pois $f(A) \not\subseteq C$. Mas, podemos definir $f \circ g$, pois $G(C) \subseteq A$.

Veja que $f \circ g(x) = f(g(x)) = 4x^2 + 4x + 1$.

Exemplo (associatividade e não-comutatividade da função composta)

Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x + 1$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x^2$ e $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $h(x) = |x|$.

Veja que $f \circ h \neq h \circ f$, pois $f \circ h(x) = f(|x|) = |x| + 1$ e $h \circ f(x) = h(x + 1) = |x + 1|$, que são diferentes!

Por outro lado, veja que $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

Injeção, Sobrejeção e Bijeção

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **injetiva (ou injetora, ou uma injeção)** se, dados $x_1, x_2 \in A$,

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2),$$

ou, equivalentemente,

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **sobrejetiva (ou sobrejetora, ou uma sobrejeção)** se,

$$Im(f) = f(A) = B.$$

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **bijetiva (ou bijetora, ou uma bijeção)** se

f é injetiva e sobrejetiva.

Injeção, Sobrejeção e Bijeção

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **injetiva (ou injetora, ou uma injeção)** se, dados $x_1, x_2 \in A$,

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2),$$

ou, equivalentemente,

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **sobrejetiva (ou sobrejetora, ou uma sobrejeção)** se,

$$\text{Im}(f) = f(A) = B.$$

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **bijetiva (ou bijetora, ou uma bijeção)** se

f é injetiva e sobrejetiva.

Injeção, Sobrejeção e Bijeção

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **injetiva (ou injetora, ou uma injeção)** se, dados $x_1, x_2 \in A$,

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2),$$

ou, equivalentemente,

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **sobrejetiva (ou sobrejetora, ou uma sobrejeção)** se,

$$\text{Im}(f) = f(A) = B.$$

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é **bijetiva (ou bijetora, ou uma bijeção)** se

f é injetiva **E** sobrejetiva .

Injeção, Sobrejeção e Bijeção

Exemplo

Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ e $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ dada por $g(x) = x^2$.

Observe que f não é nem injetiva, nem sobrejetiva, no entanto g é bijetiva!

Exemplo

Seja $T = \{x : x \text{ é um triângulo no plano}\}$. Definamos a função $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ com lei de associação

$$f(x) = \text{área de } x .$$

Temos que f não é uma função injetiva e nem sobrejetiva!

Exemplo

Seja $f : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ com lei de associação

$$f(x) = \det(x).$$

Temos que f é uma função sobrejetiva, mas que não é injetiva!

Injeção, Sobrejeção e Bijeção

Exemplo

Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ e $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ dada por $g(x) = x^2$.

Observe que f não é nem injetiva, nem sobrejetiva, no entanto g é bijetiva!

Exemplo

Seja $T = \{x : x \text{ é um triângulo no plano}\}$. Definamos a função $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ com lei de associação

$$f(x) = \text{área de } x .$$

Temos que f não é uma função injetiva e nem sobrejetiva!

Exemplo

Seja $f : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ com lei de associação

$$f(x) = \det(x).$$

Temos que f é uma função sobrejetiva, mas que não é injetiva!

Injeção, Sobrejeção e Bijeção

Exemplo

Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ e $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ dada por $g(x) = x^2$.

Observe que f não é nem injetiva, nem sobrejetiva, no entanto g é bijetiva!

Exemplo

Seja $T = \{x : x \text{ é um triângulo no plano}\}$. Definamos a função $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ com lei de associação

$$f(x) = \text{área de } x .$$

Temos que f não é uma função injetiva e nem sobrejetiva!

Exemplo

Seja $f : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ com lei de associação

$$f(x) = \det(x).$$

Temos que f é uma função sobrejetiva, mas que não é injetiva!

Função Inversa

Definição

Seja X um conjunto qualquer. Definimos a **função identidade de X** como sendo

$$id_X : X \longrightarrow X \text{ tal que } id_X(x) = x, \forall x \in X.$$

Observe que id_X é uma função bijetiva!

Definição

Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função. Dizemos que $g : B \longrightarrow A$ é a **função inversa** de f se

$$g \circ f = id_A \quad \text{e} \quad f \circ g = id_B.$$

Observação

Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função. Então,

existe uma função $g : B \longrightarrow A$ inversa de $f \Leftrightarrow f$ é bijetiva.

Função Inversa

Definição

Seja X um conjunto qualquer. Definimos a **função identidade de X** como sendo

$$id_X : X \longrightarrow X \text{ tal que } id_X(x) = x, \forall x \in X.$$

Observe que id_X é uma função bijetiva!

Definição

Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função. Dizemos que $g : B \longrightarrow A$ é a **função inversa** de f se

$$g \circ f = id_A \quad \text{e} \quad f \circ g = id_B.$$

Observação

Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função. Então,

existe uma função $g : B \longrightarrow A$ inversa de $f \Leftrightarrow f$ é bijetiva.

Exemplos de Funções Inversas

Exemplos de Funções Inversas

Exemplos de Funções Inversas

Exemplo

Vamos calcular a função inversa de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $y = f(x) = 2x + 1$.

Exemplo

Vamos calcular a função inversa de $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ dada por $y = f(x) = x^2$.

Referências Bibliográficas

G. Iezzi, C. Murakami. *Fundamentos de Matemática Elementar vol. 1 - Conjuntos Funções*. 7ª ed., 2ª reimpressão. Atual Editora, 2000.

G. Iezzi, O. Dolce, C. Murakami. *Fundamentos de Matemática Elementar vol. 2 - Logaritmos*. 8ª ed., 2ª reimpressão. Atual Editora, 2000.

G. Iezzi. *Fundamentos de Matemática Elementar vol. 3 - Trigonometria*. 7ª ed., 3ª reimpressão. Atual Editora, 2001.

E. L. Lima. *Curso de Análise vol.1*. 12ª ed., 3ª impressão. Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2008.

Muito Obrigado :)